

Miscellanea Entomologica

Organe international

contenant les demandes d'échange, d'achat et de vente de collections
livres ou objets d'histoire naturelle.

Anzeiger von Tausch, Kauf und Verkauf für internationale Entomologen.

Entomologist's international Advertiser for exchange, purchase and sale.

Direction et Rédaction

E. BARTHE, à Narbonne, Aude (France).



427809

SOMMAIRE — INHALTS-VERZEICHNISS

J. J. Kieffer. Zoocécidies d'Europe (*suite*). — M. Pic. En route pour le Mzab. — Bou Saada ! (*fin*). — Sur *Asclera impressithorax* Pic. — H. Nicolas. Transformation larvaire et métamorphose nymphale. *Ephialtes histrio* ♀ Panz. (*fin*). — NÉCROLOGIE. — AVIS DIVERS. — ÉCHANGES ET ANNONCES.

1. Sur *I. britannica* L. (Frauenfeld, 1865). **Myopites tenella** Fraueuf.
 — Sur *I. crithmoides* L. (Frauenfeld, 1865). **Myopites Frauenfeldi** Schin.
 — Sur *I. dysenterica* L., *ensifolia* L. et *hybrida* L. (Frauenfeld, 1865).
 **Myopites inulæ** Ros.
 — Sur *I. viscosa* Ait. (Frauenfeld, 1865). **Myopites limbardæ** Sch.
2. Poïsses axillaires ou terminales offrant l'aspect d'un bourgeon de la grosseur d'une noisette à celle d'une noix et couvert d'une sorte de feutrage gris ou blanchâtre. Larves nombreuses. (Vallot, 1856). **Dasyneura Beckiana** Mik.
 — Déformation semblable à l'aisselle des feuilles, de la grosseur d'une noisette. Larve solitaire. Sur *I. germanica* et *hybrida* (Fr. Löw, 1888). **Cécidomyine**.
5. Galle glabre de la grosseur d'un pois à celle d'une noisette, sur la tige et sur les racines d'*I. britannica* (H. Loew, 1850), *ensifolia* (Wachtl, 1884) et [*saticina* L.? (Rudow, 1875)] M. d. l. c. **Acodiplosis inulæ** (H. Lw.) (= **Arthrocerastis** Rüb.)
 — Galle fortement velue de gris ou de brun. Sur *I. ensifolia*, *germanica* et *hybrida* (Fr. Löw, 1888) **Diplosis subterranea** Fraueuf.


Juglans regia L.

- PHYTOPT. 1. Minimes tubercules rouges, épars sur le limbe, et paraissant sur les deux surfaces de la feuille. (Vallot, 1820). **Phytoptus tristriatus** Nal.
 — Élévures de forme irrégulière, portant à la face opposée, c'est à dire sur le dessous, rarement sur le dessus, un amas de productions piliformes, connu sous le nom d'Erineum juglandinum Pers. (Vallot, 1820). **Phytoptus erineus** Nal.

Juncus.

- HÉMIPT. Inflorescence changée en une agglomération ou touffe de feuilles déformées et généralement teintes de rouge. Sur *J. alpinus* Will. (Fr. Löw, 1887), *atricapillus* Drej. (Röstrup, 1896), *conglomeratus* L. et *effusus* L. (Fr. Löw, 1887), *fuscatus* Schreb. (Schlechtendal, 1891), *fusco-ater* Schreb. (Hieronymus, 1890), *lamprocarpus* Ehrh. (Kaltenbach, 1874), *obtusiflorus* Ehrh. (idem), *silcanus* Reich., *silenticus* Reich. et *suptuus* Mueh. (P. Löw, 1881). **Livia juncorum** Latr.

(A suivre)



EN ROUTE POUR LE MZAB. - BOU SAADA !

(fin)

- | | |
|--------------------------------|---|
| <i>Trichodes Zahare</i> Chvr. | <i>Pinelia consobrina</i> Luc. |
| — <i>x. punctonotatus</i> Pic. | <i>Prionotheca coronata</i> Ol. |
| <i>Pinelia Valdani</i> Guer. | <i>Genea hispida</i> Forsk. |
| — <i>interstitialis</i> Sol. | <i>Thrioptera minuta</i> Pic n. sp. ? (2) |

* Voir nos 4, 3, 4, 6, 9, 1897.

(2) *Thrioptera minuta* n. sp. Subovale, un peu déprimé, noir à pubescence couchée peu serrée, d'un jaune grisâtre et hérissé de poils longs, redressés, foncés. Antennes à articles intermédiaires allongés. Prothorax large, bien arrondi sur le côté, orné de petits tubercules peu rapprochés et présentant quelquefois une partie médiane un peu brillante. Élytres un peu déprimés, peu allongés, subovales, un peu plus larges que le prothorax vers les épaules et présentant le r plus grande largeur après le milieu, à décalqué postérieure brusque et courte avec la par-

Tentyria longicollis Luc. (Bayon.)
Mesostena politipennis Frm. (Hénon).
 — n. sp. (Hénon).
Anemia sardea Gené
 — *rotundicollis* Dsbr. var.
Himantenus Perraulieri Mars.
Alphitobius piecus Ol.
Nemognatha chrysomelina F.
Anthicus Gœbeli Laf.
 — v. *meridionalis* Pic.
Aulacolerus sulcifera Pic.
Ochthenomus bicittatus Truq.
Zonabris Paykulli Billb.
 — v. *mozabita* Pic.
 — *Baulnyi* Mars.
 — *menthae* Klug. (Hénon).
 — *incerta* Klug.
 — v. *unijuncta* Pic.
 — *litigiosa* Reiche (Hénon).
 — *calida* Pal. (Hénon).
 — v. *Letourneuxi* Pic.
 — *elegans* Ol.
 — *argenti-fer* Pic.
 — *Allardi* Mars. v. (Hénon).
 — v. *semi-fasciatus* Pic.
Ceroctis corynoides Reiche (Hénon).

Cabalia ruficollis Frm
Lytta herbensis Esen.
Desphoricaria chrysoprasis Frm. (Hénon).
Helobatus v. plurifrons Frm.
Etheon varhius margarinosus Fr.
Grenops Jakob All.
Cassinoderes exotilus Ol.
Euroceps tumentosus Flur.
Cleonus hieroglyphicus Oliv.
Bothynoderes excoarctatus Gyl. (Hénon).
Loricus unopunctatus F. var.
Loricus unicolor L. minor.
Barytus corinthius Dsbr.
Sabina (plusieurs).
Photinus parvithorax Dsbr.
 — *isabellinus* Sch.
Polysarthron Jolyi Pic (Joly, Bayon.)
Pseudocolaspis Leprieuri Lef.
Titubia attenuata Frm.
Adonia mutabilis Scrib.
Euxochorus anthoderus Frm.
 — *pubescens* Kust.
Scymnus ruscatus Geof. var.
 — *Klöseuettleri* M.
Pharus anchora O Frm. (Bayon.).
 — *vanidensis* Sicard (in lit.).

Chasses de Letourneux dans le M'zab.

Coptognatus Lofranci Muls.
Vertumnus amictulus.
Pachydema (deux espèces).
Rhizotrogus ? *Magagnosei* Guér.
 — *nitidiventris* Frm.
 — *deserticola* Blanch.
Phyllopertha Lucasi Frm.

? *Anthotobius imperialis* Panz.
Adesmia biskrensis Luc.
Crita straminealis Luc n. sp. pres.
Megalentus Fricoli Sol.
Anemia Fasti var.
Zonabris letornata Frm.
Apatophysis babera Luc.

Après deux jours de séjour seulement à Ghardaïa, je reprends le chemin du retour en l'aimable compagnie d'un officier qui revient d'El Goleah (1), ce pays presque inconnu hors de l'élément militaire : mais les renseignements donnés ne sont pas faits pour m'engager à tenter un jour, dans ce coin à peu près neuf au point de vue entomologique, quelque excursion fatigante, monotone et peut être très pauvre — je commence à avoir pris ma part de longues excursions — puisse un collègue français, plus intrépide, en essayer l'aventure bientôt ; elle est grande, notre Algérie, curieuse à voir, intéressante en découvertes, profitons-en donc et nous, français, avant les étrangers plus voyageurs ; le même ne peut pas tout entreprendre.

tie présuturale avancée ; ils sont ornés de petits tubercles en lignes de points forts assez régulièrement et disposés en lignes et présentant des stries presque effacées. Dessous du corps pubescent orné de petits tubercules. Tibias antérieurs peu longs, peu épais. Long. 12-15 mill.

Près de *Varrasi* Sol., mais à pubescence couchée plus claire et forme plus large ; cette forme large paraît du reste distinguer cette espèce des autres voisines du genre. D'après la description, *Tr. minuta* différencierait de *villosa* Sol., au moins par les articles intermédiaires des antennes longs.

(1 D'abord quelques insectes ont été rapportés de cette région par un soldat et distribués par plusieurs entomologistes à plusieurs autres.

Puis ne pas abuser de la patience de mes lecteurs, rapidement j'esquisserai le retour avec, comme nouveauté de voyage, un de nos chevaux tombant épuisé et laissé-abandonné, encore pantelant, en pâture aux fauves ; une journée et demie de chasse à Laghouat avec un temps affreux de pluie, un départ dans un sol détrempé ou la voiture risque à chaque instant de s'embourber, puis arrêt de 2 jours à Djelfa.

De Djelfa, pour varier, je remonte par Bou Saâda (1). Au service d'été la voiture part à 4 heures du soir pour arriver à Bou Saâda sur les sept heures environ du matin. Il faut emporter des provisions pour la route. Je prends place dans un mauvais break pour commencer un voyage des plus mouvementés, car, malgré la légèreté de la voiture, à la suite de pluies d'orage, nous manquons de rester embourbés dans plusieurs bas fonds boueux. Pas le temps de s'ennuyer durant ce trajet, encore moins celui de dormir ! A chaque instant le conducteur vient nous prier de descendre, puis peu après il nous invite à pousser aux roues « si nous ne voulons pas rester en plein champ » ; nous sommes quatre heureusement ; un à chaque roue, et une poussée vigoureuse nous sauve d'un arrêt complet. Enfin nous arrivons à Bou Saâda n'ayant en route qu'un cheval fourbu et perdu la moitié de nos bagages.

La faune de Bou Saâda où feu Leprieur fit autrefois de belles découvertes est riche je nommerai les espèces suivantes :

Liste de Coléoptères de Bou Saada et environs.

<i>Cicindela Trounii</i> Guer.	<i>Orythyrea deserticola</i> Luc.
<i>Athia venator</i> F.	— <i>auna</i> Coq.
<i>Heteracantha depressa</i> Brull.	<i>Jalodis cicatricosa</i> Luc.
<i>Lionemis chlorotica</i> Frm.	— <i>Famini</i> Luc.
<i>Stilicus festinus</i> Muls.	<i>Psiloptera composita</i> Klug.
<i>Saprinus rufipes</i> Payk.	— <i>tarsata</i> Herbst. var. (à forme très étroite et allongée).
— <i>minutus</i> Gyl.	<i>Aaculocheira Dufei</i> Luc.
<i>Telopes Heydeni</i> Reitt.	<i>Aem edera</i> ♂-formata Luc.
— <i>posticidis</i> Frm.	<i>Paratossa cor ebiformis</i> Frm.
<i>Aulonium bicolor</i> Herbst. var.	<i>Agrilus pubiventris</i> Ksw.
<i>Bastrychus frontalis</i> Fahr.	<i>Cylindromorphus pinguis</i> Frm.
— <i>v. nigricentris</i> .	<i>Trachys reflexi</i> Gené
— <i>v. luctuosus</i> Oliv.	<i>Cardiophorus confornis</i> Dsbr. v.
<i>Graphys viridicollis</i> Luc.	— <i>v. Caroli</i> Pic.
<i>Pachydema rubripennis</i> Luc.	<i>Melanotus dichrous</i> Er.
— <i>niticolleis</i> Frm.	<i>Zygia scutellaris</i> Muls.
— <i>Hornbecki</i> Luc.	— <i>oblonga</i> Fabr.
<i>Rhyztrojus araneipes</i> Frm.	<i>Dasyles algiricus</i> Luc.
<i>Hoploplus atriplicis</i> Frm.	<i>Adesmia microcephala</i> Sol.
<i>Phyllopertha Lucasi</i> Frm.	— <i>Solieri</i> Luc.
<i>Aphodius longispinus</i> Kust.	— <i>affinis</i> Sol.
— <i>hyalochæus</i> F.	— <i>Foremonti</i> Luc.
— <i>punctipennis</i> Er.	<i>Megagenius Frioli</i> Sol.
— <i>leucopterus</i> Klug.	<i>Blaps propheta</i> Reiche
— <i>sitiphoides</i> d'Orb.	— <i>Stavichi</i> Reiche
<i>Rhyssenus hybridus</i> Reitt.	<i>Panelia Valdani</i> Guer.
— <i>subulosus</i> Muls.	— <i>atomala</i> Sénae
<i>Rhyssenus casolles</i> Reitt.	— <i>interstitialis</i> Sol.
<i>Psammobius lævipennis</i> Costa	— <i>Lucasi</i> Reiche.
<i>Eremacus unistriatus</i> Muls.	— <i>pilifera</i> Sénae
<i>Glaresis</i> sp.	— <i>obsoluta</i> Sol.
<i>Onthophagus sticticus</i> Harold	<i>Mesostena valida</i> Kr.
— <i>melanocephalus</i> Klug.	<i>Adelostoma cristatum</i> Esch.
— <i>nebrtosus</i> Reiche	

(1) Pensant écrire quelque jour un récit particulier sur Bou Saada et ses environs, je ne ferai que tracer ici la marche à suivre pour aider à entreprendre la même excursion.

- Micrositus compactus* Frm.
Mucipsa celov Guer.
— *caevifrons* Frm.
Sagitta Chanzji Frm.
Lydus mendax Frm. var.
Zonabris incerta Klug.
— *gilvipes* Chvr.
— v. *Lanogi* Mars.
— *menthae* Klug.
— *Hemprichi* Klug.
— *litigiosu* Chev.
— *batnensis* Mars.
Coryna Bleusei Chob.
Corocelis cor noides Reiche
Caristela megalops Frm.
Cyrtolepus Caroli Pic
Rhytirrhinus Caroli Frm.
— *impressicollis* Boh.
Larinus rugicollis Bohm.
— *Kirschi* var. n. sp. pres.
— *cynarae* Fabr. var.
Eumyceterus albosquamulatus
Bhm.
Baridius sellatus Boh.
— *opiparis* Duv.
Tychius Grenieri Bris.
Ocalitus holonelas Frm.
Bruchus (Mylabris) Poupillieri
All.
Tomieus proximus Lich.
Polyarthron Descauri Frm.
Capnocerambyx nuaritanicus
Luc.
Hesperophanes affinis Luc.
Clytunthus 6-guttatus Luc.
? *Macrolenes saulensis* Pic
Titubæri Lefereui Pic.
Corys phala crassipes Lef.
Pachybrachys Caroli Mars.
Pseudocolaspis carbonaria Lef.
— *crassipes* Lef.
— *Leprieui* Lef.
Plectroscelis tibialis Illig.
Balanomorpha limbata All.
Bothinoteres basigranatus Frm.
— *ercoriatus* Gyl.
— *obliquus* F.
Eumecops albotessellatus Frm.
— *clathratus* Oliv.
Diastrichelus v. sicutus Frm.

En Hyménoptères je numérotai deux espèces : *Chrysis nomina* Buys., *Andrena holomelana* Lep.

De Bou Saâda je regagne la ligne de Constantine-Alger en passant par Aïn Kerman, Sidi Aïssa, Aumale et Bouira, assez long trajet, mais dans des voitures plus solides et surtout plus larges. Le trajet de Bou Saâda à Aumale est d'environ 120 kilomètres (encore des provisions à emporter pour la route), les prix sont de 12 fr. intérieur et 15 fr. compé, la franchise est de 10 kilos et le supplément 0,12 par kilo.

Tous les deux jours une autre voiture fait le service de Bou Saâda à Bordj Bou Areridj en traversant l'extrémité du fameux Hodna (le pays d'origine du rarissime *Placcurus Caroli* Lepr.), et en passant par Msila.

Les facilités de transport entre Bouira et Aumale sont nombreuses, la concurrence diminue les prix dans de moins rustiques omnibus ; il semble même que les chevaux eux aussi sont plus confortables ; mais tout paraît meilleur, plus rapide, peut-être, à cause du terme du voyage qui s'approche. Ah ! combien on est heureux de le prendre, après une quinzaine de jours de voiture, ce train léger qui dévore les paysages et vous emporte, les jambes étendues, les genoux libres des colis qu'une place trop exigüe vous a forcé de porter. Elle nous emporte, la machine de fer rapide, loin, bien loin de ces étranges pays ensablés et malgré cela, fermant les yeux à la verdure qui nous entoure maintenant, nous revoiyons encore, sous l'influence d'un charme étrange, mirage du souvenir, les immes ités troublantes dans leur cachet de mort, inoubliables dans leur sauvage puissance.

